

## *Corrigenda*

### *Une nouvelle chanterelle du Costa-Rica : Cantharellus atrolilacinus sp. nov. Cryptogamie, Mycologie 24 (1), p. 21-25, 2003.*

La clé du texte original doit être remplacée par la suivante :

1. Espèces de la forêt tropicale de plaine :

- a. Hyménophore nettement lamellé ou régulièrement plissé sur les spécimens parvenus à maturité ; basidiome pourpre-orangé : ***Cantharellus guyanensis*** Mont.
- b. Hyménophore lisse ou presque ; espèce minuscule, jaune pâle, à chapeau mesurant 15-18 mm de diamètre et à marge fortement fimbriée : ***Cantharellus xanthoscyphus*** R. H. Petersen & Mueller.

2. Espèces associées aux *Fagaceae* (*Quercus*, *Nothofagus*), souvent en altitude :

– *Sous Quercus* :

- a. Basidiome jaune doré, jaune d'œuf à orange, marqué de squamules grises brunâtres ; sous *Quercus humboldtii* : ***Cantharellus lateritius* var. *colombianus*** R. H. Petersen & Mueller (voir aussi *Cantharellus cibarius* var. *cantharellus* au sens de Heim, 1954).
- b. Basidiomes à tonalités lilas évidentes sur le chapeau et le stipe, sous *Quercus* en forêt de moyenne altitude : ***Cantharellus atrolilacinus* sp. nov.**

– *Sous Nothofagus*. Chapeau 17-22 mm, orange carotte puis orange brunâtre ; sous *Nothofagus dombeyi* : ***Cantharellus nothofagorum*** R. H. Petersen & Mueller.

